

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Feminella® Hyalosoft makšties ovulės

Sudėtis

Kiekvienoje 1,7 g makšties ovulėje yra 5 mg natrio hialuronato, 10 mg sintetinio E vitamino, ekstraktų iš 60 mg azijinės raistenės, 60 mg dedešvos ir 60 mg ramunėlių, 2 mg arbatmedžių aliejaus, 20 mg koloidinio silicio dioksido ir 1483 mg pusiau sintetinių gliceridų.

Indikacijos

Feminella® Hyalosoft ovulės vartojamos makšties gleivinei drėkinti, esant makšties sausumui dėl hormonų kiekio pokyčių bet kuriuo gyvenimo laikotarpiu, ypač menopauzės periodu, po gimdymo ir žindymo laikotarpiu, arba dėl chemoterapijos ar spindulinio gydymo.

Dėl drėkinamojo poveikio Feminella® ovulės lengvina makšties atrofijos simptomus (pvz., niežulį, deginimą, tempimą bei nemalonius pojūčius lytinių santykių metu).

Dozavimas

Vartoti po vieną makšties ovulę 10 parų iš eilės arba pagal gydytojo nurodymus.

Makšties sausumas menopauzės laikotarpiu

Pradinis gydymas. Pirmas 10-20 parų vartoti po vieną ovulę per parą.

Palaikomasis gydymas. Vartoti po 1 ovulę 2 kartus per savaitę.

Vartojimo būdas

Feminella® ovulės vartojamos į makštį.

Išimkite ovulę iš lizdinės plokštelės ir atplėškite nuo juostelės. Lėtai perplėškite plėvelę, suėmę abiejų rankų nykščiais ir smiliais. Atsargiai išimkite ovulę iš plastiko plėvelės ir pirštu švelniai įstumkite giliai į makštį. Tai daryti geriausia prieš miegą.

Kontraindikacijos

Alergija (padidėjęs jautrumas) bet kuriai Feminella® ovulių medžiagai.

Įspėjimai

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Lizdines plokšteles laikyti kartono dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos.

Kartu su kitokiomis makšties ovulėmis (pvz., kontraceptinėmis) ar prezervatyvu vartoti negalima.

Mėnesinių metu ar gausių makšties išskyrų atveju vartoti negalima.

Nėštumo metu Feminella® ovulių galima vartoti tik gydytojo nurodymu.

Ilgai vartojamos ovulės nedažnai atvejais gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijų. Tokiu atveju vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją.

Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Feminella® ovulių vartoti negalima.

Prieš vartojimą atidžiai nusiaplaukite rankas. Iš lizdinės plokštelės išimtą ovulę vartokite tuoj pat. Jeigu lizdinė plokštelė pažeista, ovulių vartoti negalima.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.







Gamintojas

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

Gewerbestrasse 18-20

A-2102 Bisamberg, Wien

Austrija

	SIMBOLIAI <i>acc. EN 980:2003</i>	
1)	GAMINTOJAS arba simbolis CSC Pharmaceuticals Handels GmbH Gewerbestrasse 18-20 A - 2102 Bisamberg	
2)	CE ženklas	
3)	Serijos numeris	
4)	Tinka iki	
5)	Perskaitykite vartojimo instrukciją	
6)	Laikymo temperatūra	
7)	Vienkartinis vartojimas	